

CONTRIBUTIONS A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

LXXIX. PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS.

(SUITE)

Par A. GUILLAUMIN.

- Strasburgeria robusta* Guillaum. — Mt Mou (Vieillard 2369).
Tribulus cistoides L. — St-Vincent, Gatope (Vieillard 271), îlot O. de Tanlé (Deplanche 156).
Boronella Pancheri Baill. — Balade (Vieillard 274).
Dutailleya Poissonii Guillaum. — Nouméa (Vieillard 2454).
Olax hypoleuca Baill. — Wagap (Vieillard 3129).
Ilex Sebertii Panch. et Seb. — Sans localité (Vieillard 39), Nouméa (Vieillard 2494), Yaté (Vieillard 870), Ounia (Vieillard 1705), Mt Mou (Deplanche ? 12), Canala (Vieillard 860, 2493), Wagap (Vieillard 2492), Balade (Vieillard 1334, 1861).
Phelline Billardieri Panch. — Balade (Vieillard 351 = 350 = 348 = 289, 348, 39 = 349).
Phelline comosa Labill. — Wagap (Vieillard 346), Wagap, Balade (Vieillard 2240).
P. confertifolia Baill. — Gatope (Vieillard 2472).
Dysoxylum albicans Vieillard ex DC. — Sans localité (Deplanche 292 in Vieillard 2426), 19 in *Mus. neocal.*), Balade (Vieillard, 261).
P. Balansaeorum C. DC. var. *pedunculata* C. DC. — Sans localité (Pancher 227, 228), Wagap (Vieillard 2423, 2428, pro parte), Balade (Vieillard 1707).
D. bijugum Seem. — Nouméa (Vieillard 45), Mt Dore (Vieillard 263), Wagap (Vieillard 2435), Gatope (Vieillard 263, 2436), « Matchipoa » à Lifou.
D. chrysophyllum Vieill. ex DC. — Gatope (Vieillard 2427).
D. gatopense C. DC. = *D. macranthum* C. DC. — Gatope (Vieillard 2439).
D'après les descriptions, il y aurait une différence de longueur des pétioles entre les 2 espèces, mais les types sont absolument comparables.
D. glomeratum C. DC. — Sans localité (Pancher 226), Nouméa (Vieillard 2424), Wagap (Vieillard 2428 pro parte).
D. minutiflorum C. DC. — Sans localité (Pancher 612).
D. nitidum C. DC. var. *angustifolium* C. DC. — Sans localité (Deplanche 291 pro parte), Gatope (Vieillard 2425 pro parte).

- var. *lanceolatum* C. DC. — Sans localité (*Deplanche* 291 pro parte).
- var. *obtusifolium* C. DC. — Sans localité (*Deplanche* 291 pro parte); Poume (*Deplanche* 69), Gatope (*Vieillard* 2425 pro parte), Pouébo (*Deplanche* 290 bis), Cap Tonnerre (*Vieillard* 197).
- D. Pancheri* C. DC. — Témala près Gatope (*Vieillard* 2434), Gatope (*Vieillard*).
- D. roseum* C. DC. — Canala, La Conception (*Pancher*).
- D. unijugum* C. DC. — Yaté (*Vieillard* 266).
- D. Vieillardii* C. DC. — Wagap (*Vieillard* 863).
- Aglaia elæagnoides* Benth. — Canala (*Vieillard* 3).
- Carapa moluccensis* Bl. — Sans localité (*Deplanche* 294), Nouméa (*Vieillard* 264), Port boisé (*Deplanche* 45), Gatope, Wagap, Canala (*Vieillard* 2437), île Pam (*Deplanche* 4).
- Amoora Balansæana* C. DC. — Sans localité (*Vieillard* 336), Wagap (*Vieillard* 2429).
- Pleurostyliia Wightii* W. et Arn. var. *neo-caledonica* Loes. — M^t Mou (*Deplanche* 21 in *Vieillard* 337).
- Maytenus Fournieri* Loes. — Sans localité (*Vieillard* 7, 57, *Pancher* 124), Païta (*Vieillard* 274 = 316), Wagap (*Vieillard* 316, 2477), Balade (*Vieillard* 316 = 274, 338), Gomonen (*Vieillard* 2475), Tanlé, Poume (*Deplanche* 73).
- M. Pancheriana** Guillaum. nom. nov. = *Gymnosporia Pancheriana* Loes. — Sans localité (*Deplanche* 305).
- M. Sebertiana* Loes. — Poume (*Deplanche* 305), Gomonen (*Vieillard* 2475 pro parte).
- Peripterygia marginata* Loes. — M^t Dore (*Vieillard* 223) Mgnes d'Ounoua, Canala, M^t Dore (*Vieillard* 233), Tupiti (*Deplanche*).
- Elæodendron curtispiculum* Endl. — Sans localité (*Vieillard* 2479).
- Ventilago buxoides* Baill. — Tanlé, baie du Sud (*Vieillard* 2487), île Tanlé (*Deplanche* 272 in *Mus. neoacal.* 30).
- V. pseudo-calyculata* Guillaum. — Lifou (*Vieillard* 2392).
- Berchemia Fournieri* Panch. et Seb. — Nouméa (*Vieillard* 28), Canala (*Vieillard* 292), Balade (*Vieillard* 322).
- Colubrina asiatica* L. — Balade (*Vieillard* 274 = 316, 342 = 321).
- Emmenospermum Pancherianum* Baill. — Sans localité (*Pancher* 121, 213), Nouméa (*Pancher*).
- Alphitonia neo-caledonica* Guillaum. — Nouméa (*Deplanche* 12), Canala (*Vieillard* 291 = 312); Canala, Wagap (*Vieillard* 313), Balade (*Vieillard* 312), Poume (*Vieillard* 2489, *Deplanche* 54).
- A. xerocarpa* Baill. — Wagap (*Vieillard* 2477).
- Gouania Le Ratii* Schltr. — Wagap (*Vieillard* 283), Témala près Gatope (*Vieillard* 2485). Ce dernier échantillon est intermédiaire entre le type à feuilles et rameaux glabres ou presque et l'échantillon à feuilles et rameaux très veloutés : Gatope (*Vieillard* 2484).

- Cayratia carnosa* Gagnep. — Canala (Vieillard 270), St Vincent, Balade, Lifou (Vieillard 270).
- C. japonica* Gagnep. — Lifou (Deplanche 46), « Wahana ».
- Allophyllus tahitensis* Radlk. — En donnant ce nom dans l'herbier de Paris à l'échantillon : Balade (Vieillard 302), Radlkofer se demandait s'il n'y avait pas erreur ou transposition d'étiquette. Il existe à Paris et à Caen 3 échantillons de la même provenance de sorte qu'un interchangement d'étiquettes serait peu probable ; toutefois dans l'herbier de Caen, dans la même chemise, non fixés, se trouvent un rameau florifère à pubescence pulvérulente et inflorescence simple qui paraît bien se rapporter à *A. ternatus* et un rameau fructifère à inflorescence glabre en panicule qui se rapporte à *A. tahitensis* de sorte que le doute subsiste quant à la présence de cette dernière espèce en Nouvelle-Calédonie.
- A. ternatus* Radlk. — Sans localité (Vieillard 9).
- A. timorensis* Bl. — Nouvelle-Calédonie (Vieillard 2469).
- Alectryon carinatus* Radlk. — Pouangué (Deplanche 17 in *Mus. neocal.*), St-Vincent (Vieillard 222).
- Guioa fusca* Radlk. ? — Sans localité (Pancher 142 pro parte).
- G. glauca* Radlk. — Pic de Pouébo (Vieillard 2467).
- G. microsepala* Radlk. — Wagap (Vieillard 213, 2396).
- G. villosa* Radlk. form. *dasyclados* Radlk. — Prony (Le Rat 176).
- Cupaniopsis apiocarpa* Radlk. ? — Gatope (Vieillard 2383).
- C. azantha* Radlk. — Balade (Vieillard 356).
- C. fruticosa* Radlk. — Pouanlotch près Gatope (Vieillard 2403).
- C. ganophloea* Radlk. — Nouméa (Vieillard 39), Gatope (Vieillard 2401).
- C. glomeriflora* Radlk. — « Scit » à Lifou.
- C. macrocarpa* Radlk. ? — Gatope (Vieillard 2389).
- C. petiolulata* Radlk. — Gatope (Vieillard 2091).
- Storthocalyx chryseus* Radlk. — Baie de Tupiti (Deplanche in Vieillard 244 ?).
- S. leioneurus* Radlk. — Sans localité (Vieillard 2386).
- Elattostachys apetala* Radlk. — Sans localité (Deplanche 282, Vieillard 2404). Lifou (Deplanche b, c).
- Arytera collina* Radlk. — Sans localité (Deplanche ? 18 in *Mus. neocal.*).
- A. lepidota* Radlk. — Rivière du Pont cassé (Le Rat 110).
- Gongrodiscus sufferrugineus* Radlk. — Balade (Vieillard 357).
- Cossignia trifoliata* Radlk. — Sans localité (Pancher), Gatope (Vieillard 2382).
- Loxodiscus coriaceus* Hook. f. — Ile des Pins (Vieillard 281).
- Dodonæa viscosa* Labill. — Balade (Labillardière), Gatope (Vieillard 2413), île des Pins (Vieillard 50).
- L'échantillon n° 25 récolté en août 1858 ne l'a pas été par

Cuming ainsi que le dit Radlkofer (*Pflanzenreich* IV /165, p. 1369) mais par Mac Gillivray ; Cuming n'a jamais d'ailleurs herborisé en N^{lle}-Calédonie, que je sache.

Herpullia austro-caledonica Baill. — Wagap (*Vieillard* 2400), Lifou (*Vieillard* 2406, *Deplanche a*).

Euroschinus Vieillardii Engl. — N^{lle}-Calédonie (*Vieillard* 2399).

Santaloides Vieillardii Schellenb. — M^t Dore (*Vieillard* 387).

Crotalaria quinquefolia L. — Balade (*Vieillard* 359).

Lotus australis Andr. — Ile des Pins (*Vieillard* 47).

Tephrosia Le Ratiana Harms — Mgnes de Tiouaka (*Vieillard* 362).

Sesbania ægyptiaca Pers. — Nouméa (*Vieillard* 363).

Ormocarpum cochinchinense Meer. — Wagap (*Vieillard* 398).

Desmodium pycnostachyum Benth. — Balade (*Vieillard* 376).

D. umbellatum DC. — Nouméa (*Vieillard* 36).

D. varians Endl. — Balade (*Vieillard* 366).

Arthroclianthus caudatus Schindl. ? — N^{lle}-Calédonie (*Deplanche* 208).

A. Le-Ratii, Schindl. — Balade (*Vieillard* 369).

Glycine tabacina Benth. — Balade (*Vieillard* 375).

Erythrina indica Lam. — Balade (*Vieillard* 380).

Strongylodon lucidus Seem. — Port boisé ou baie de Noua (*Deplanche* 29).

Mucuna gigantea DC. — Poila (*Vieillard* 383).

Pueraria Thunbergiana Benth. — Balade (*Vieillard* 378) « Yaté ».

Phaseolus obovatus Grah. — N^{lle}-Calédonie (*Deplanche* 28) « Kôbu ».

Leucæna insularum Dänik. — Lifou (*Deplanche*).

Albizia Guillainii Guillaum. — Nouméa (*Vieillard* 80).

A. lentiscifolia Benth. — N^{lle}-Calédonie (*Deplanche* 31).

Licania gerontogæa Schltr. — Gatope (*Vieillard x*).

Alstonia Balansæ Guillaum. — Wagap, Tiouaka (*Vieillard* 2244).

Graptophyllum pictum Griff. — (M^{me} Leenhardt sans n^o et 62)
« Khamo ».

Antigonum leptopus Endl. — Nouméa (*Le Rat* 481).

Celtis hypoleuca Planch. — Wagap (*Vieillard* 3130).

Hedycaria tapeinospermæfolia Guillaum. — Wagap (*Vieillard* 3134).

Amyema scandens Danser. — M^t Dzumac (*Le Rat*, 2544).

Amylothea pyramidata Danser. — M^t Dzumac (*Le Rat* 2661) sur
Cupanopsis ! distyphora ? ou *fruticosa ?*

Smilax ligustrifolia A. DC. — N^{lle}-Calédonie (*Pancher* 90).

S. plurifurcata A. DC. ? — Prony (*Le Rat*, 134).

Diffère du type par ses feuilles glauques en dessous.

* *Styphandra glauca* R. Br. — N^{lle}-Calédonie (*Montrouzier*).

L'indigénat de cette plante qui n'a été trouvée qu'une seule fois me paraît des plus douteux.

Dianella revoluta R. Br. — Route d'Houaïlou à Koua (*Le Rat* 2224).
Potamogeton fluitans Roth ? — Col d'Amieu (*Le Rat* 78), La Foa
(*Cribs*) 270) ¹.

* *Aponogeton* sp. — Anse Vata (*Le Rat* 766) ¹.

Aucun représentant de la famille des Aponogétonacées n'avait encore été signalé en N^{lle}-Calédonie, il semble toutefois que c'est au genre *Aponogeton* que doit être rapporté cet échantillon malheureusement sans fleur ni fruit.

1. Déterminé par M^{lle} A. Camus.